


Weinerntedaten 2017

Pillnitzer Weinbautag 2018




Wetterstation Dresden Pillnitz


monatlicher Niederschlag in mm

Standort: Versuchsfeld Dresden-Pillnitz

- Mittelwert 1961-1990
- Mittelwert 1991-2016
- 2017




Wetterstation Dresden Pillnitz



Weinanbaugebiet Sachsen 2017/ 2018

- rund **494 ha Rebfläche** im Ertrag
- davon 467 ha im Bundesland Sachsen
 - 82 % weiße Rebsorten
 - 18 % rote Rebsorten
- bewirtschaftet von **2083 Winzern**
 - 99 % Kleinwinzer

	2007	2010	2016	2017
gemeldete Winzer	3686	2573	2304	2083
- Haupterwerb	21	21	37	38
- Nebenerwerb	13	13	40	42
- Kleinwinzer	3652	2539	2227	2003





Entwicklung von Hektarerträgen und Mostgewicht im Weinanbaugebiet Sachsen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamt- weinernte hl	15955	16146	18157	21148	25142	27005	9890	12223	24028	20610	15452	20916	24713	28845	26192
Ertrags- reblfläche ha	407	407	396	409	426	447	432	433	447	481	488	492	491	493	494
Hektar- ertrag hl/ha	39	40	46	52	59	60	23	28	54	43	32	42	50	59	53
Mostge- wicht ° Oe	91	86	86	92	85	84	89	77	83	89	89	78	81	82	79



Weinernte 2017 im Weinanbaugebiet Sachsen

Weißwein	31.07.2017	2017	2017	2006-2016			Differenz
	Ertrags- reblfläche ha	Gesamt- ertrag hl	Ertrag hl/ha	Duchschnitt ertrag hl/ha	Ertrag maxim hl/ha	Ertrag minimal hl/ha	2017 zum Durchschnitt hl/ha
Müller Thurgau	69,79	4809	68,90	53,48	74,70	13,68	+15,42
Riesling	69,83	3182	45,56	47,33	63,80	26,70	-1,77
Weißburgunder	58,12	3201	55,07	46,60	70,97	14,08	+8,47
Ruländer	45,45	1839	40,46	37,10	52,84	18,73	+3,36
Kerner	26,72	1477	55,28	51,75	79,18	19,53	+3,53
Traminer	26,41	941	35,63	29,55	49,30	13,15	+6,08
Goldriesling	27,87	1511	54,23	55,52	74,30	30,60	-1,29
Scheurebe	22,45	1465	65,27	49,51	66,78	23,18	+15,76
Bacchus	13,95	762	54,64	61,93	85,80	38,86	-7,29
Elbling	9,29	593	63,82	74,68	135,60	34,56	-10,86



Säure und Mostgewicht der Weinernte 2016 und 2017

Weißwein	2016	2017	2016	2017
	Mostgewicht ° Oe	Mostgewicht ° Oe	Säure ‰	Säure ‰
Müller Thurgau	75,0	72,0	7,6	7,9
Riesling	82,0	81,5	9,0	9,3
Weißburgunder	85,8	84,6	8,0	8,2
Ruländer	89,7	85,6	8,1	8,5
Traminer	95,3	93,4	7,0	6,4
Kerner	85,8	80,7	7,3	9,0
Goldriesling	77,4	71,5	7,0	7,0
Scheurebe	79,2	78,5	7,5	7,5
Bacchus	78,6	73,5	8,1	7,3
Elbling	67,0	77,7	10,2	8,0




Weinernte 2017 im Weinanbaugebiet Sachsen

Rotwein	31.07.17	2017	2017	2006-2016			Differenz
	Ertrags- rebläche	Gesamt- ertrag	Ertrag hl/ha	Durchschnitt ertrag	Ertrag maxim.	Ertrag minimal	2017 zum Durchschnitt
	ha	hl	hl/ha	hl/ha	hl/ha	hl/ha	hl/ha
Spät- burgunder	40,08	1759	43,88	33,25	58,7	10,76	+10,63
Dornfelder	19,24	1138	59,16	67,99	100,64	32,51	-8,88
Regent	10,82	730	67,43	56,87	80,26	32,36	+10,56

Säure und Mostgewicht der Weinernte 2016 und 2017

Rotwein	2016	2017	2016	2017
	Mostgewicht ° Oe	Mostgewicht ° Oe	Säure ‰	Säure ‰
Blauer Spätburgunder	93,1	84,0	7,7	8,7
Dornfelder	77,3	76,9	7,0	7,8
Regent	85,7	80,8	6,7	7,5

Weinerntemengen in hl und deren Qualitäten




Anbauentwicklung der Sorte Goldriesling 2005- 2017


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
bestockte Rebfläche in ha	12,8	12,8	15,9	16,9	20,8	20,5	22,6	23,6	24,4	25,7	26,3	27,7	28,8
Ertragsrebfläche in ha	12,3	12,4	12,4	16,1	16,1	16,3	20,2	23,2	22,9	24,9	25,4	25,7	27,9
Gesamtertrag in hl	705	875	921	982	493	616	1102	1220	958	1513	1495	1744	1511
Ø Ertrag in hl/ha	57,3	70,6	74,3	61,0	30,6	37,8	54,6	52,6	41,8	60,8	58,8	67,8	54,2
Mostgewicht in ° Oe	71,4	78,2	73,9	73,1	80,3	69,8	73,6	80,3	74,9	72,2	69,8	77,4	71,5
Säure in Promille	7,3	6,2	8,2	8,7	6,3	9,4	5,9	6,4	7,9	7,7	6,7	7,0	7,0

Rebsortenspiegel 2017


- 67 Rebsorten insgesamt -



Entwicklung der Weißweinflächen in den letzten 17 Jahren




Entwicklung der Rotweinflächen in den letzten 17 Jahren




Entwicklung pilzwiederstandsfähige Rebsorten

Sorten	2006 in ha	2014 in ha	2017 in ha
Solaris	5,48	9,17	9,24
Johanniter	0,72	3,11	3,31
Carbernet blanc	0,00	2,92	3,13
Souvignier gris	0,00	1,94	2,71
Muscaris	0,00	1,02	1,31
Regent	7,25	10,63	10,82
Cabernet Cortis	0,00	0,87	0,93
sonstige	0,59	3,53	3,81
bestockt gesamt in ha	14,04	33,19	35,25
Anteil Piwis an bestockte Fläche in %	3,37	6,61	7,01

Weinbestände und Erntemengen für Weißwein im Vergleich von 2003 - 2017



Weinbestände und Erntemengen für Rotwein im Vergleich von 2003 - 2017



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

